

HANTAVIRUS

Dos síndromes, una mateixa amenaça zoonòtica

Què són


Família de virus presents a Amèrica, Europa i Àsia, transmesos principalment per rosegadors (ratolins, rates i talpons) a través de l'orina, femtes i saliva.

Transmissió

Les persones es contagien normalment en respirar l'aire contaminat amb partícules seques d'orina, saliva o femtes de rosegadors infectats.

Tractament

No hi ha un tractament específic ni vacunes. El tractament és de suport: repòs, hidratació i control dels símptomes.




AMÈRICA



Oligoryzomys longicaudatus

El ratolí de cua llarga és el principal reservori del genotip Andes, responsable de la majoria dels casos de síndrome pulmonar per hantavirus (SPH) a la regió.

Síndrome Pulmonar (HPS/HCPS)




EUROPA I ÀSIA



Apodemus agrarius

El ratolí d'arrossar és un dels principals reservoris dels virus Hantaan i Seoul, causants de la febre hemorràgica amb síndrome renal (HFRS) a la Xina i Corea.

Febre Hemorràgica amb Síndrome Renal (HFRS)



[*] Variable segons el virus causant.

La prevenció és clau

Per exemple: segellar forats a les llars, utilitzar trampes per a rosegadors, emmagatzemar aliments en recipients a prova de rosegadors, i utilitzar desinfectant en netejar zones contaminades.

